

Revisi Nur Maziah ok.docx

Date: 2019-07-22 10:55 WIB

\* All sources 10 | Internet sources 5 | Own documents 2 | Plagiarism Prevention Pool 1

- [2] [https://dinaagustina11.blogspot.com/2014/11/v-behaviorurldefaultvmlo\\_13.html](https://dinaagustina11.blogspot.com/2014/11/v-behaviorurldefaultvmlo_13.html)  
4.7% 8 matches

---

- [3] <https://mrschoraera.blogspot.com/2013/09/makalah-askeb-1-kebutuhan-fisik-ibu.html>  
4.5% 8 matches

---

- [4] <https://ibubidanku.blogspot.com/2015/03/...edua-dan-ketiga.html>  
2.7% 4 matches

---

- [5] <https://bangsalsehat.blogspot.com/2018/1...r-3-pdf-dan-doc.html>  
2.8% 6 matches  
 1 documents with identical matches

---

- [7] "TA.docx" dated 2019-07-09  
1.8% 6 matches

---

- [8] <https://sahabatsejatimayah.blogspot.com/...rimester-ketiga.html>  
2.5% 5 matches

---

- [9] from a PlagScan document dated 2018-10-14 01:45  
0.6% 2 matches

---

- [10] "Diana Putri 1621110007.docx" dated 2019-07-05  
0.5% 1 matches

10 pages, 1613 words

PlagLevel: 10.4% selected / 55.0% overall

73 matches from 11 sources, of which 6 are online sources.

**Settings**Data policy: *Compare with web sources, Check against my documents, Check against my documents in the organization repository, Check against organization repository, Check against the Plagiarism Prevention Pool*Sensitivity: *Medium*Bibliography: *Consider text*Citation detection: *Reduce PlagLevel*Whitelist: *--*

## BAB I

Upaya penurunan AKI dan AKB tingkat pertama pada pelayanan kesehatan masyarakat maupun perorangan untuk mencapai derajat tertinggi dengan upaya promotif dan preventif. Sesuai peraturan dari menteri kesehatan republik indonesia no. 75 2014. Berdasarkan data yang didapat dari PMB Ritrin dwi agustini jelakombo jombang, 2018 terdapat 10 (0,1%) dari jumlah keseluruhan 180 ibu hamil yang mengalami keluhan sering kencing termasuk Ny "M"

<sup>[7]</sup>▶ Berdasarkan jurnal kebidanan,, Jumlah yang sering buang air kecil di Indonesia 2018 kisaran 50%.<sup>[7]</sup>▶ Provinsi Jawa Timur jumlah ibu hamil yang tidak bisa menahan BAK sebesar 37,9%.<sup>[7]</sup>▶ Sedangkan yang pada umur 28-40 minggu yaitu 17,5%.

### Tujuan Umum

1. Memberikan asuhan ibu hamil tm III
- <sup>[ 9 ]</sup> ▶ 2. Memberikan asuhan pada ibu bersalin
- <sup>[ 9 ]</sup> ▶ 3. Memberikan asuhan pada bayi baru lahir

#### 1.1.1. Manfaat teoritis

Hasil laporan ini bisa dibuat wacana pustaka dan ilmu bagi pembacanya.

1. Untuk instansi pendidikan  
Semoga bisa dijadikan masukan terhadap instansi pendidikan.
2. Untuk bidan  
Bisa dijadikan bahan meningkatkan pelayanan pada ibu dan anak.
3. Untuk ibu  
Untuk meningkatkan pengetahuan pada masa hamil sampai KB.

### 1.1.2. Sasaran

Sasaran dalam askeb ini adalah Ny M dengan kehamilan, persalinan, nifas, BBL, neo, KB.

### 1.1.3. Tempat

Tempat dilakukannya adalah di PMB Ririn D.A, SST Jelkombo Jombang..

Waktu

ASKEB dilakukan Januari-Juli.

## BAB II

### TINJAUAN TEORI

#### 2.1 Konsep Dasar pada Kehamilan

Normalnya kehamilan adalah 9 bulan 7 hari yang dihitung dari hari pertama keluarnya haid yang terakhir. TM III berlangsung 13 minggu (minggu ke 28-40).

Beberapa perubahan alamiah yang dialami oleh ibu hamil TM III antara lain perubahan sistem reproduksi, akibat bertambahnya hormon estrogen menyebabkan vulva dan vagina menjadi sangat berpengaruh, terlebih pada saat persalinan mukosa dinding vagina menjadi lebih panjang. Pada serviks konsentrasi kolagen terjadi penurunan. Ostium interena menjadi rasio tertinggi pada elastin terhadap kolagen. Baik otot polos maupun elastin akan semakin menurun jumlahnya.

#### 2.2 Konsep Dasar pada Persalinan

Persalinan merupakan pengeluaran hasil konsepsi yang terjadi diantara usia kehamilan 37-42 minggu atau disebut dengan usia kehamilan cukup bulan, berlangsung kurang lebih 18 jam. Asuhan dasar persalinan normal adalah upaya pencegahan komplikasi, manajemen asuhan persalinan yang bersih dan aman sampai bayi lahir. Persalinan merupakan proses yang normal namun bisa menjadi abnormal jika tidak ditangani dengan tepat. Setiap ibu hamil dan bayi baru lahir berhak mendapatkan pelayanan yang berkualitas.

### 2.3 Konsep Dasar pada Nifas

Masa nifas masa kembalinya alat organ reproduksi setelah melahirkan menjadi seperti sebelum hamil. Berlangsung selama 6 minggu. Masa nifas yang normal organ reproduksi kembali seperti sebelum hamil diantaranya serviks, vagina, uterus .

### 2.4 Konsep BBL

Persiapan meningkatkan kualitas manusia dapat dilakukan dengan pelayanan kebidanan sejak dini. BBL harus diperiksa secara rutin agar tidak terjadi penyulit atau komplikasi pada 24 jam pertama bayi. Riwayat kehamilan ibu ataupun kelaianan yang diturunkan dapat menjadi pertimbangan masalah potensial dari setiap kelainan yang ditemukan pada saat antenatal. Dan diberikan upaya promotif dan preventif pada setiap kelas ibu hamil untuk mengurangi angka resiko tinggi maupun komplikasi kehamilan dan bayi yang akan dilahirkan.

### 2.6 Konsep KB

KB adalah program pemerintah untuk mengatasi keluarga yang belum berkeinginan untuk memiliki keturunan, keluarga yang ingin membatasi jumlah kelahiran anak, maupun keluarga yang sangat mengidamkan kehamilan.

2. Penerimaan (acceptance) Penerimaan kehamilan di pengaruhi oleh banyak faktor.<sup>[5]</sup> Rendahnya penerimaan cenderung di hubungkan dengan tidak direncanakannya kehamilan dan bukti ketakutan serta konflik.<sup>[5]</sup> Pada trimester tiga menggabungkan perasaan bangga dengan rasa takut menghadapi persalinan.(Kebidanan et al., 2017)

3. Nutrisi Di trimester ke III, ibu hamil butuh energi memadai.<sup>[2]</sup> Selain untuk mengatasi beban yang berat, juga cadangan energi untuk persalinan kelak.<sup>[2]</sup> Maka dari itu ibu perlu memakan makanan yang bergizi, gizi waktu hamil juga perlu di tingkatkan hingga 300 kalori per hari.<sup>[2]</sup> Pertumbuhan otak janin akan terjadi cepat sekali pada dua bulan terakhir menjelang persalinan, karena itu jangan sampai kekurangan gizi.<sup>[2]</sup> Berikut adalah gizi yang sebaiknya lebih di perhatikan pada kehamilan trimester ke III, tanpa mengabaikan gizi lainnya (Asrinah, dkk. 2015). 1)

Angka kematian bayi di negara-negara ASEAN seperti Singapura

3/1000 per kelahiran hidup, Malaysia 5,5/1000 per kelahiran hidup, Thailand 17/1000 per kelahiran hidup, Vietnam 18/1000 per kelahiran hidup, dan Philipina 26/1000 per kelahiran hidup, dan di Indonesia sebesar 34/1000 per kelahiran hidup (Depkes, 2010).

Metode amenore laktasi

Mal adalah suatu alat kontrasepsi yang tdak mnggunakan alat apapun dan alami, yaitu dengan cara menyusui bayi dengan asi eksklusif tnpa tmbahan minuman apapun untuk Sng bayi. Kb ini hanya barlaku sampai 6 bulan saja setelahnya ibu harus memilih kontrasepsi lain.

## BAB III

### 3.3 ASUHAN KEBIDANAN IBU NIFAS

#### 3.3.1 Kunjungan pertama 6 jam PP

DS: mengatakan ibu perutnya masih mules-mules

### 3.4 ASUHAN KEBIDANA BBL

DS : mengatakan bayinya menangis dengan kuat.

Analisa : usia 1 jam bbl fisiologis.

Penatalaksanaan

## BAB IV

Pada Bab IV akan dijelaskan kesesuaian antara data dan teori dari data yang didapatkan di PMB ririn Dwi agustini, pada NY M kehamilan dengan keluhan sering pipis.

### 4.1 Asuhan Kehamilan

Keluhan utama saat hamil TM III adalah sering kencing, pada kunjungan selanjutnya ibu mengeluh nyeri pinggang. <sup>[10]</sup> Menurut peneliti keluhan tersebut adalah normal terjadi pada ibu hamil TM III.

Mengevaluasi tindakan yang telah dikerjakan, menjelaskan tanda bahaya TM III dan tanda persalinan, serta memberitahu jadwal kunjungan ulang.

4. Penerimaan (acceptance) Penerimaan kehamilan di pengaruhi oleh banyak faktor. Rendahnya penerimaan cenderung di hubungkan dengan tidak direncanakannya kehamilan dan bukti ketakutan serta konflik. Pada trimester tiga menggabungkan perasaan bangga dengan rasa takut menghadapi persalinan. (Kebidanan et al., 2017)

[ 5 ] ▶  
5. menunjukkan respons psikologi dan emosional yang sama selama kehamilan. 1. [5]▶

Ambivalen Pada awalnya ada rencana kehamilan kemudian terjadi hal yang mengejutkan bahwa konsepsi telah terjadi. [5]▶ Ambivalen ini berhubungan dengan pemilihan waktu yang salah. [5]▶ Ketakutan tentang peran baru, ketakutan tentang kehamilan, persalinan dan kelahiran.

Keluhan seperti yang dirasakan ibu muncul pada saat tm III tidak hanya sering kencing tapi juga kram,, varices, nyeri di punggung dan pusing, anemi adalah hal yang lumrah. [2]▶ Nutrisi Di trimester ke III, ibu hamil butuh bakal energi yang memadai. [2]▶ Selain untuk mengatasi beban yang kian berat, juga sebagai cadangan energi untuk persalinan kelak. Maka dari itu ibu perlu memakan makanan yang bergizi, gizi waktu hamil juga perlu di tingkatkan hingga 300 kalori per hari. Pertumbuhan otak janin akan terjadi cepat sekali pada dua bulan terakhir menjelang persalinan, karena itu jangan sampai kekurangan gizi. [2]▶ Berikut adalah gizi yang sebaiknya lebih di perhatikan pada kehamilan trimester ke III, tanpa mengabaikan gizi lainnya (Asrinah, dkk. 2015). 1)

Analisa data dilakukan identifikasi pada diagnosa dan masalah berdasarkan interpretasi dari hasil anamnese yang dikumpulkan mnjadi diagnosa pada analisa data.

#### Penatalaksanaan

Tindakan yang telah dilkukan pada ibu yaitu, mengevaluasi, keefektifan tindakan dan ibu mengerti tentang apa yang telah dijelaskan, seperti persiapan persalinan tanda bahaya trimester III dan kun jungan ulang.

#### 4.2 Asuhan Persalinan

Pinggang dan perut terasa nyeri akibat kontraksi adalah keluhan yang normal dialami ibu menjelang persalinan. Saat pembukaan mulai terjadi, keluar lendir bercampur dengan darah. Memantau kontraksi pada uterus yaitu dengan cara tangan di tempelkan d perut lalu di putar searah jarum jam dan melihat jam dinding atau tangan untuk melihat waktu yang dengan kurun waktu 10 menit.

Memantau His setiap 30 menit yang dinilai pada 10 menit pertama terjadi berapa kali kontraksi, dengan hasil 2x his dalam 10 menit lamanya 40 detik.

#### 4.3 Asuhan Nifas

Pada data Ny "N" 6 jam postpartum, 7 hari dan 27 hari postpartum, lochea rubra, sanguilenta, dan serosa. Diberikan VitA pasca bersalin dan diberikan lagi keesokan harinya. Tidak ada kesenjangan.

#### 4.4 Asuhan BBL

Pembahasan kali menjelaskan tentang kesesuaian anatra fakta dan teori mnurut penulis. Bayi IMD 1 jam setelah lahir,tidak ada yang aneh yang menyertai. Bayi baru lahir yang cukup ialah 2500 sampai dengan 4000 gram. Awal ibu memberikan asi ialah waktu pertama kali bayi lahir. Ditimbang berat badan dalam batas normal. Pemeriksaan fisik secara menyeluruh, bayi tidak ada komplikasi, penyulit ataupun kelainan kongenital.<sup>[7]</sup> Panjang bayi 49 cm, sesuai dengan ukuran normal bayi baru lahir yang cukup bulan, karena normalnya 48- 50 cm. Dari data tersebut tidan ada kesenjangan.

#### 4.5 Asuhan Neonatus

Menjelaskan tentang kesesuaian fakta dan teori pada neon atus Ny yang disajikan pada data berikut: <sup>[7]</sup>TTV dalam batas normal. Sesuai teori; romauli 2011. Bayi normal suhunya 36,5- 27,5 °C. Pernafasan neonatus normal antara 40-60 kali



permenit, DJJ tidak kurang dari 120 dan tidak lebih dari 160x/menit. Berdasarkan data kunjungan neonatus Ny N berjalan dengan normal.

#### 4.6 Asuhan KB

Pembahasan asuhan kebidanan KB, menjelaskan tentang adanya kesenjangan antara teori dan fakta. Berikut data yang diperoleh dari asuhan KB yang dilaksanakan. KB yang digunakan oleh Ny "N" adalah MAL. Tidak ada kesenjangan.

Terapat 2 metode kontrasepsi yang sederhana, diantaranya kontrasepsi dengan alat, dan kontrasepsi sederhana tanpa alat. Metode kalender, MAL, metode 3 lendir servik, metode coitus interruptus merupakan kontrasepsi sederhana tanpa alat. Cup serviks, kondom, spermisida, dan diafragma merupakan kontrasepsi sederhana dengan alat.

#### Kesimpulan

Asuhan kebidanan telah dilakukan kurang lebih 3 bulan, dimulai dari ibu hamil trimester III sampai dengan KB..

#### Bagi peneliti berikutnya

Diharapkan mendapatkan keluhan yang nyata dan sesuai dengan opini dan teori.

#### 1. Bagi Institusi

Stikes diharapkan mengembangkan pembelajaran dan sarana belajar untuk melaksanakan asuhan kebidanan komprehensif pada keluhan sering kencing.

#### Kesimpulan

Asuhan kebidanan telah dilakukan kurang lebih 3 bulan, dimulai dari ibu hamil trimester III sampai dengan KB..

#### Bagi peneliti berikutnya

Diharapkan mendapatkan keluhan yang nyata dan sesuai dengan opini dan teori.

## 2. Bagi Institusi

Stikes diharapkan mengembangkan pembelajaran dan sarana belajar untuk melaksanakan asuhan kebidana komprehensif pada keluhan sering kencing.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hutahaean, Serri. 2013, Perawatan Antenatal. Jakarta: Salemba
- Manuaba. 2010, Asuhan Pada Kehamilan. Jakarta: Salemba Medika(Doroh, 2018)
- Maryunani. 2009, Manajemen Kebidanan Terlengkap. Jakarta: Cv. Trans Info.
- Mubarak. 2011, promkes Kebidanan. Jakarta: Salemba Medika
- Romauli. 2015, Buku Asuhan Nifas dan Menyusui. Jakarta: EGC
- Rustam, Mochtar 2012, Buku Ajar Asuhan Kebidanan Ibu Nifas dan Menyusui. Jakarta: Cv. Trans Info.
- Saifuddin. 2009, Panduan Kesehatan Maternal Neonatal. Jakarta: EGC. (Upt and Gajahan, 2018)
- Purwandari. 2015, Fisiologis Selama persalinan. Jakarta: EGC (Purwandari, Manupake and Anggraini, 2015)
- Proverawati. 2015, Buku Neonatus, Bayi, dan Balita. Jakarta: Cv Trans Info
- Handayani. 2010, Buku Pelayanan KB. Yogyakarta: Pustaka Rihama. (Ii, 2013)