

## **Digital Receipt**

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: Silva Yunieka

Assignment title: Revision 1

Submission title: KADAR KOLESTEROL TOTAL PAD...

File name: KTI\_SEMHAS\_SILVA\_OKE\_2\_word...

File size: 726.95K

Page count: 37

Word count: 5,769

Character count: 36,540

Submission date: 30-Aug-2020 07:23PM (UTC+0700)

Submission ID: 1376260465

## BAB 1

## PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Merokok merupakan kebiasaan menghisap rokok yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yang tidak bisa dhindari oleh orang yang memiliki ketergantungan terhadap rokok (Soetjiningsih, 2010). Menurut Tobacco Atlas edisi kelima (2015) merokok adalah penyebab kanker paru 90%, 75% penyakit paru obstrukiti (PPOK), dan 25% dari penyebab serangan jantung Pada perokok aktif, merokok dupat mengancam seluruh organ tubuh mulai dari gangguan fungsi sanpai kanker, seperti penyakit jantung koroner, stroke, saluran peranfasan, saluran cerna, gangguan sistem reproduksi dan kehamilan. Dampak dari rokok tersebut tidak hanya timbul pada perokok aktif namun perokok pasif juga akan mengalami gangguan fungsi pada organ tubuh (Kemenkes Rt, 2014).

Rokok merupakan salah satu permasalahan nasional maupun internasional yang menyebabkan 5.4 juta kematian pada tahun 2006 dengan rata-rata 1 kematian dalam setiap 6.5 detik. Jika kebiasaan merokok terus berlanjut kematian pada tahun 2020 akan meningkat menjadi 2 kali dari jumlah kematian saat ini, (Lisa Elizabet, 2010). Menurut WHO tembakau dapat membunuh lebih dari 5 juta orang pertahun dan akan membunuh 10 juta orang pada tahun 2020. Dari jumlah itu, 70% berasal dari Negara berkembang (Wahyu, 2009).

Saat ini di Indonesia menjadi penduduk dengan perokok terbanyak di ASEAN, dengan presentase (46,16%), diikuti Filipina (16,62%), dan

1