

Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: Ratna Suminar

Assignment title: ITSKES JOMBANG

Submission title: HUBUNGAN CARA MENERAN DENGAN KEJADIAN RUPTUR PE...

File name: Ratna_Suminar_REV1.doc

File size: 361K

Page count: 45

Word count: 6,417

Character count: 40,449

Submission date: 13-Oct-2022 10:24PM (UTC-0700)

Submission ID: 1925015688

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perincum menutupi pintu atas panggul antara vulva dan anus. Otot perencum, fascinurogenitalis, dan diafragma panggul. Robekan perincum terjadi saat bayi dilahirkan secara spontan atau dengan alat bantu. Jika kepala janin dilahirkan terlalu cepat, robekan perincum garis tengah dapat berkembang menjadi parah. Robekan perincum dan atonia uteri terjadi pada sebagian besar primipara. Robekan serviks atau vagina menyebabkan perdarahan posspartum yang berkontraksi dengan baik.

Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjuian (SDGs) bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu (AKI) (Profil Keschatan Indonesia, 2018). AKI Indonesia tetap tinggi. Indonesia memiliki angka kematian ibu etinggi di ASEAN pada tahun 2017 sebesar 305 per 100,000 kelahiran hidup. AKI Kaltiur 2017 sebesar 110 per 100,000 kelahiran hidup. AKI Kaltiur 2017, Tahun 2017 AKI Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 7 per 100,000 kelahiran hidup (Profil Dinas Keschatan Kutai Kartanegara, 2017). Perdarahan (28%), preeklamsia (24%), dan infeksi (11%) merupukan penyebab utama.

Kesulitan persalinan menyebabkan AKI (Profil Kesehatan Indonesia, 2018). Perdarahan, hipertensi, infeksi, partus lama, abortus, dan lain-lain menyebabkan peningkatan AKI. Elemen fisik, emosional, dan sosial dapat mempersulit persalinan. Pada tahun 2018. Riskesdas melaporkan AKI vane

1