

PENGARUH PRENATAL MESSAGE TERHADAP PENURUNAN NYERI PUNGGUNG PADA IBU HAMIL TRIMESTER III

by Fithriyah, Rizki Dyah Haninggar Ratna Sari Dewi

Submission date: 04-Mar-2023 08:45AM (UTC+0800)

Submission ID: 2028390282

File name: 731-Article_Text-1643-1-10-20210210_1.pdf (246.08K)

Word count: 3428

Character count: 19057

**PENGARUH PRENATAL MASSAGE TERHADAP PENURUNAN NYERI
PUNGGUNG PADA IBU HAMIL TRIMESTER III
(Di Desa Ceweng, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang)**

Fitriyah¹ Rizki Dyah Haninggar² Ratna Sari Dewi³

^{1,2}STIKes Insan Cendekia Medika Jombang

¹email : fitriyahsh@gmail.com, ²email : rizki_dyah89@gmail.com, ³email : bidanratnasaridewi@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pendahuluan. Nyeri punggung adalah salah satu ketidak nyamanan pada kehamilan karena dapat mengganggu aktifitas ibu hamil. Nyeri punggung disebabkan adanya proses adaptasi pada tubuh ibu hamil. Berdasarkan hasil wawancara pada 10 ibu hamil, 4 ibu hamil pernah melakukan pijat hamil, dan 6 ibu hamil belum pernah melakukan pijat saat hamil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *prenatal massage* terhadap penurunan nyeri punggung ibu hamil trimester III di Desa Ceweng, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. **Metode.** Penelitian Jenis penelitian *pra-eksperimental* dengan *one-group pretest post-test design*. Populasi penelitian seluruh ibu hamil trimester III di Desa Ceweng, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang berjumlah 32 ibu hamil. Sampel penelitian sejumlah 32 ibu hamil diambil secara total *sampling*. **Variable independent prenatal massage** dan **variable dependent** penurunan nyeri punggung. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner dengan analisa data *spearman Rank*. **Hasil.** Penelitian menunjukkan sebelum dilakukan *prenatal massage* nyeri yang dialami ibu hamil menurut FPS-R tidak nyeri 2(6.3%), sedikit nyeri 2(6.3%), sedikit lebih nyeri 10(31.2%), lebih nyeri 9(28.1%), sangat nyeri 8(25.0%), dan nyeri sangat hebat 1(3.1%). Setelah dilakukan *prenatal massage* didapat hasil: tidak nyeri 9(28.1%), sedikit nyeri 10(31.2%), sedikit lebih nyeri 9(28.1%), lebih nyeri 4(12.5%). Uji statistik *Spearman rank* menunjukkan $p\text{-value}=0.000<\alpha(0.05)$ sehingga H_0 ditolak. **Kesimpulan,** penelitian ini terdapat pengaruh *prenatal massage* terhadap penurunan nyeri punggung ibu hamil trimester III Di Desa Ceweng, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang.

Kata Kunci : *Prenatal Massage*, Nyeri Punggung, Ibu Hamil Trimester III

**THE INFLUENCE OF PRENATAL MASSAGE TO DECREASE THE PAIN ³OF THE
BACK OF THE MOTHER PREGNANT TRIMESTER III**

ABSTRACT

Introduction. Back pain is one of the uncomfortable on pregnancy Because it can be disturbing activity pregnant. The cause of back pain is the process of the adaptability on the body pregnant women. Based on the results of interview on 10 pregnant women, 4 pregnant women have done massage pregnant. And 6 pregnant women have never do massage while pregnant. This study aims to determine the effect of prenatal massage against a decrease in back pain pregnant women third trimester In the Ceweng Village, Diwek District, Jombang County. **Research Method.** The kind of research *pra-eksperimental* with *one-group pretest post-test-design*. The population of the research all off The third trimester pregnant women in Ceweng village, Diwek District, Jombang County amounts to 32 pregnant women. A sample of research as much as 32 pregnant women taken in *all sampling*. **Variable independent prenatal massage** and **variable dependent decline back pain**. Research instruments using the questionnaire with the analysis of the data *spearman Rank*. **Research**

Result. The results of research showing before done prenatal massage pain experienced pregnant women according to the FPS-R not pain 2 (6,3 %), a little pain 2 (6,3 %), a little more painful 10 (31,2 %), more painful 9 (28,1 %), very painful 8 (25,0 %), and the pain was great 1 (3,1 %). After done prenatal massage obtained results: Don't pain 9 (28,1 %), a little pain 10 (31,2 %), a little more painful 9 (28,1 %), more painful 4 (12,5 %). Test statistics Spearman rank shows $-value=0,000 < \alpha (0,05)$ so H_1 accepted. **Conclusion.** The conclusion this research are the influence of prenatal massage against a decrease in back pain pregnant women third trimester In the Ceweng Village, Diwek District, Jombang County.

Keyword: Prenatal Massage, Back Pain, Pregnancy Trimester III

PENDAHULUAN

Salah satu keluhan yang sering di alami oleh ibu hamil trimester III adalah nyeri punggung hal tersebut disebabkan karena meningkatnya beban berat yang di bawa oleh ibu yaitu bayi dalam kandungan (Walyani, 2015, 35). Sistem tubuh ibu pada proses kehamilan mengalami perubahan yang semuanya membutuhkan suatu adaptasi, baik fisik maupun psikologis. Adaptasi tersebut banyak ibu yang mengalami rasa ketidaknyamanan salah satunya adalah nyeri punggung. Nyeri punggung pada ibu hamil dapat di atasi dengan *prenatal massage*.

Menurut Ratih (2015, 3) hasil dari penelitian pada ibu hamil diberbagai daerah Indonesia mencapai 60-80% orang yang mengalami *back pain* (nyeri punggung) pada kehamilannya. Di Provinsi Jawa Timur di perkirakan sekitar 65% dari 100% ibu hamil mengalami *back pain* (nyeri punggung).

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 14 Maret 2019 terdapat 35 ibu hamil di Des. Ceweng, Kec. Diwek, Kab. Jombang. Hasil wawancara pada 10 ibu hamil trimester III di Desa Ceweng, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, 4 ibu hamil mengatakan pernah melakukan pijat saat hamil dan ibu merasakan lebih nyaman dan nyeri punggung berkurang setelah dilakukan pemijatan, dan 6 ibu hamil menyatakan belum pernah melakukan pemijatan pada saat hamil karena mereka khawatir akan mengganggu pada perkembangan janin.

Cara untuk mengurangi nyeri punggung ibu bisa di lakukan beberapa hal seperti berikut misalkan berjalan dipagi hari, gunakan bantal tambahan sebagai penopang pada bagian pinggang dan punggung pada saat tidur, relaksasi, senam hamil, massage, rendam air hangat dapat meredakan otot-otot dan agar ibu hamil trimester III mengantangi aktifitas dan menjaga postur tubuhnya, tulang punggungnya harus selalu tegak dan tidak membungkuk (Harsono, 2013, 47).

BAHAN DAN METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah *one group pretest post test design* yang merupakan penelitian eksperimen dimana tidak menggunakan pembanding (*control*). Populasi penelitian adalah seluruh ibu hamil trimester III di Desa Ceweng, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang sebanyak 32 ibu hamil. Sampel penelitian sejumlah 32 ibu hamil diambil secara *total sampling*. Variabel *independent* penelitian ini adalah *prenatal massage* dan variabel *dependent* penelitian ini adalah perurunan nyeri punggung pada ibu hamil trimester III. *Instrumen* penelitian ini adalah kuesioner dan uji *spearman rank* (Nursalam, 2015, 82)

HASIL PENELITIAN

1. Data Umum

15

Tabel 1 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Umur Ibu Hamil

Trimester III Di Desa Ceweng, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang Pada Tanggal 27 Mei- 02 Juni 2019.

N o	Umur	Frekuensi (f)	Persentase (%)
12	< 20 th	4	12,5
2	20-35 th	21	65,6
3	>35 th	2	21,9
	Total	32	100,0

Sumber : Data Primer 2019

Berdasarkan tabel 1 Menunjukkan bahwa sebagian besar responden berusia 20-35 tahun yaitu 21 responden (65,6 %)

9
Tabel 2 Distribusi frekuensi berdasarkan pendidikan Ibu Hamil Trimester III di Desa Ceweng, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang Pada Tanggal 27 Mei- 02 Juni 2019.

N o	Pendidikan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Tidak Sekolah	0	0
2	SD-SMP	5	15,6
3	SMA/SMK	22	68,8
4	Perguruan Tinggi	5	15,6
	Total	32	100,0

Sumber : Data Primer 2019

Berdasarkan tabel 2 Menunjukkan bahwa sebagian besar responden berpendidikan SMA/SMK yaitu 22 responden (68,8%).

8
Tabel 3 Distribusi frekuensi berdasarkan pekerjaan Ibu Hamil Trimester III di Desa Ceweng, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang Pada Tanggal 27 Mei- 02 Juni 2019.

No.	Pekerjaan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	IRT	11	34,4
2	Wirausaha	10	31,3
3	Swasta	10	31,3
4	NS	1	3,1
	Total	32	100,0

Sumber : Data Primer 2019

14
Berdasarkan tabel 3 Menunjukkan bahwa hampir setengah dari responden bekerja sebagai IRT yaitu 11 responden (34,4%).

11
Tabel 4 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Paritas Ibu Hamil Trimester III di Desa Ceweng, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang Pada Tanggal 27 Mei-02 Juni 2019.

N o	Paritas	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Primipara	7	21,9
2	Multipara	18	56,2
3	Grandmultipar	7	21,9
	Jumlah	32	100,0

Sumber : Data Primer 2019

Berdasarkan tabel 4 Menunjukkan bahwa sebagian besar responden 10 berparitas multipara yaitu 18 responden (56,3%).

Tabel 5 Distribusi frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Pernah Mengangkat Beban Yang Berat Selama Hamil pada Ibu Hamil Trimester III Di Desa Ceweng, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang Pada Tanggal 27 Mei-02 Juni 2019.

No	Mengangkat Beban	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Sudah Pernah	6	18,8
2	Belum Pernah	26	81,2
	Jumlah	32	100,0

Sumber : Data Primer 2019

Berdasarkan tabel 5 Menunjukkan bahwa hampir seluruh responden belum pernah mengangkat beban yang berat yaitu 26 responden (81,2%).

6
Tabel 6 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Pernah Membungkuk yang Berlebihan Selama Hamil pada Ibu Hamil Trimester III Di Desa Ceweng, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang Pada Tanggal 27 Mei-02 Juni 2019.

N o	Beban	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Sudah Pernah	7	21,9
2	Belum Pernah	25	78,1
	Jumlah	32	100,0

Sumber : Data Primer 2019

Berdasarkan tabel 6 Menunjukkan bahwa hampir seluruhnya responden belum pernah membungkuk yang berlebihan selama hamil yaitu 25 responden (78,1%).

Tabel 7 Distribusi frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Pernah Melakukan *Prenatal Massage* Selama Hamil pada Ibu Hamil Trimester III Di Desa Ceweng, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang Pada Tanggal 27 Mei-02 Juni 2019.

N o	Pernah <i>prenatal</i> <i>Massage</i>	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Sudah Pernah	8	25,0
2	Belum Pernah	24	75,0
	Jumlah	32	100,0

Sumber : Data Primer 2019

Berdasarkan tabel 7 Menunjukkan bahwa hampir seluruhnya responden belum pernah melakukan *prenatal massage* selama hamil yaitu 24 responden (75,0%).

2. Data Khusus

Tabel 8. Distribusi Frekuensi Nyeri Punggung Sebelum Dilakukan *Prenatal Massage* pada Ibu Hamil Trimester III Di Desa Ceweng, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang Pada Tanggal 27 Mei-02 Juni 2019.

N o	Nyeri Punggung	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Tidak Nyeri	2	6,3
2	Sedikit Nyeri	2	6,3
3	Sedikit Lebih Nyeri	10	31,2
4	Lebih Nyeri	9	28,1
5	Sangat Nyeri	8	25,0
6	Nyeri Sangat Hebat	1	3,1
	Total	32	100,0

Sumber : Data Primer 2019

Berdasarkan tabel 8 Menunjukkan bahwa nyeri punggung sebelum dilakukan tindakan *Prenatal Massage* pada ibu hamil trimester III, hampir dari setengah ibu hamil trimester III mengalami nyeri

punggung dengan Sedikit lebih nyeri sejumlah 10 responden (31,2%).

Tabel 9. Distribusi Frekuensi Nyeri Punggung Setelah Dilakukan *Prenatal Massage* pada Ibu Hamil Trimester III Di Desa Ceweng, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang Pada Tanggal 27 Mei-02 Juni 2019.

N o	Nyeri Punggung	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Tidak Nyeri	9	28,1
2	Sedikit Nyeri	10	31,2
3	Sedikit Lebih Nyeri	9	28,1
4	Lebih Nyeri	4	12,5
5	Sangat Nyeri	0	0
6	Nyeri Sangat Hebat	0	0
	Total	32	100,0

Sumber : Data Primer 2019

Berdasarkan tabel 9 Menunjukkan bahwa nyeri punggung setelah dilakukan tindakan *Prenatal Massage* pada ibu hamil trimester III Di Desa Ceweng Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, hampir dari setengah ibu hamil trimester III mengalami nyeri punggung dengan Sedikit nyeri sejumlah 10 responden (31,2%).

Tabel 10 Tabulasi Silang Pengaruh *Prenatal Massage* Terhadap Perurunan Nyeri Punggung Pada Ibu Hamil Di Desa Ceweng, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang Pada Tanggal 27 Mei- 02 Juni 2019.

Int.	Setelah tindakan						To %
	0	1	2	3	4	5	
en							
si							
as							
ny							
er							
Se	0	2	6	0	0	0	0
bel		3					2
w	1	1	3	1	1	3	6
m		1	1	1	1	3	
tin	2	5	15	3	9	6	31
da		6	4	2	3	0	
ka	3	1	3	9	3	9	28
"		1	3	4	2	6	
	4	0	0	3	9	3	25
				4	4	4	
	5	0	0	0	1	3	
					1	1	10
To	9	28	10	31	9	28	4
tal		1	2	1	1	1	0
							32
							0

16 Uji statistik p value $0,000 < \alpha (0,05)$.

Sumber : Data Primer 2019

Berdasarkan tabel 10 Hasil penelitian dari 32 ibu hamil menunjukkan bahwa sebagian kecil terjadi penurunan nyeri punggung, sebelum dilakukan latihan *Prenatal Massage* dan setelah dilakukan *Prenatal Massage* yaitu 31,3% atau sebanyak 10 responden, dengan nyeri sebelum latihan *Prenatal Massage* menurut FPS-R sedikit lebih nyeri (3) dan setelah dilakukan latihan *Prenatal Massage* dengan nyeri menurut FPS-R sedikit nyeri (2). Setelah data diolah dengan SPSS 17 dengan uji *Spearman Rank* menunjukkan bahwa nilai signifikansi p value adalah $0,000 < \alpha (0,05)$, sehingga H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh *prenatal massage* terhadap penurunan nyeri punggung pada ibu hamil trimester III di Desa Ceweng, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang.

PEMBAHASAN

1. Nyeri Punggung Pada Ibu Hamil Sebelum Dilakukan *Prenatal Massage*

Berdasarkan tabel 8 Menunjukkan bahwa nyeri punggung ibu hamil sebelum dilakukan tindakan *Prenatal Massage* pada ibu hamil trimester III di Desa hampir dari setengah ibu hamil trimester III mengalami nyeri punggung dengan sedikit lebih nyeri sejumlah 10 responden (31,3%).

Menurut peneliti nyeri punggung yang dialami oleh ibu hamil disebabkan oleh membesarnya uterus karena janin yang berkembang sehingga menyebabkan tubuh ibu menjadi lordosis. Hal tersebut memberikan tekanan pada tubuh ibu sehingga menyebabkan nyeri punggung. Berat badan ibu yang bertambah juga bisa mempengaruhi nyeri punggung karena dengan bertambahnya berat badan akan mempengaruhi otot untuk lebih banyak bekerja sehingga menyebabkan stres pada sendi.

Hal ini sesuai dengan teori (Robson 2013, 23) Nyeri punggung adalah gangguan yang umum terjadi pada ibu hamil. Hal tersebut disebabkan karena membesarnya rahim berpengaruh pada pusat gravitasi, membentang keluar dan melemahkan otot-otot perut, mengubah postur tubuh, serta memberikan tekanan pada punggung. Kelebihan berat badan tentu sangat mempengaruhi otot untuk lebih banyak bekerja sehingga mengakibatkan stres pada sendi. Sakit punggung yang sering dialami ibu dalam masa kehamilan ketika kehamilan memasuki trimester ke III dengan rasa nyeri yang sering muncul terutama di punggung, punggul hingga kebagian kaki.

Faktor-faktor yang mempengaruhi nyeri punggung yaitu pekerjaan, dan paritas.

18 otor yang pertama yaitu pekerjaan berdasarkan tabel 3 Menunjukkan bahwa sebagian besar dari responden bekerja baik itu wiraswasta ataupun swasta yaitu sejumlah 20 responden (62,6%).

Menurut peneliti nyeri panggung yang dialami ibu hamil trimester III dikarenakan ibu hamil terlalu banyak melakukan aktivitas fisik yang berlebihan, ketika ibu hamil harus mengurus rumah tangga di samping itu juga ibu harus bekerja, sehingga menyebabkan ibu kelelahan dan kurang istirahat.

Hal tersebut ada didalam penelitian Kovac, Fransisco dkk (2012, 37) menyebutkan bahwa beberapa studi terdahulu menemukan adanya hubungan antara bekerja dan aktivitas fisik yang berat dengan tingginya resiko kerja diantaranya nyeri punggung selama kehamilan. Penelitian tersebut mengkombinasikan berbagai macam kegiatan aktivitas fisik sehari-hari seperti; aktivitas bekerja, aktivitas di rumah, waktu luang atau istirahat, dan waktu untuk berolahraga. Kegiatan-kegiatan tersebut sangat berpotensi terjadi akutitas yang berat, seperti dalam bekerja dan berolahraga sehingga mempengaruhi nyeri yang dialami seseorang.

Faktor yang kedua yaitu paritas berdasarkan tabel 5,4 Menunjukkan bahwa sebagian besar responden berparitas multipara yaitu 18 responden (56,3%) dan grandmultipara sejumlah 7 responden (21,9%).

Menurut peneliti ibu multipara dan grandmultipara lebih beresiko mengalami nyeri punggung dibandingkan dengan yang primipara karena otot-otot wanita multipara dan grandmultipara lebih lemah sehingga hal tersebut menyebabkan otot gagal untuk menopang uterus atau rahim yang membesar.

Para wanita primigravida biasanya memiliki otot abdomen yang sangat baik karena otot tersebut belum pernah mengalami peregangan sebelumnya. Masalah tersebut bisa memburuk jika ternyata otot-otot wanita tersebut lemah sehingga gagal menopang uterus atau rahim yang membesar. Tanpa sokongan, uterus akan mengendur, kondisi yang membuat lengkungan punggung semakin memanjang. Kelemahan otot abdomen lebih umum terjadi pada grandmultipara yang tidak melakukan latihan. (Varney, 2014, 96).

2. Nyeri Punggung Pada Ibu Hamil Sesudah Dilakukan *Prenatal Massage*

Berdasarkan tabel 9 Menunjukkan bahwa nyeri punggung ibu hamil setelah dilakukan tindakan *Prenatal Massage* hampir dari setengah ibu hamil trimester III mengalami nyeri punggung sedikit nyeri sebanyak 31,3% sejumlah 10 responden.

Menurut peneliti *prenatal massage* dapat membuat ibu hamil menjadi lebih rilex dan senang, karena dengan dilakukan *prenatal massage* akan memperlancar sirkulasi darah ibu. Hal tersebut juga bisa mengurangi rasa nyeri yang di rasakan oleh ibu hamil.

Prenatal Massage dapat meredakan nyeri pada punggung, dalam hal ini peredaran darah ibu akan mengalir lancar yang dapat meredakan rasa sakit secara alami dalam kehamilan. *Prenatal Massage* juga membuat ibu merasa senang dan rilex, sentuhan orang yang peduli menolong merupakan sumber kekuatan ibu (Iica, 2014, 2).

3. Pengaruh *Prenatal Massage* Terhadap Penurunan Nyeri Punggung Pada Ibu Hamil Trimester III

Berdasarkan tabel 10 Menunjukkan bahwa hampir setengah dari responden terjadi penurunan nyeri punggung, sebelum dilakukan *Prenatal Massage*

dan setelah dilakukan *Prenatal Massage* yaitu 31,3% atau sebanyak 10 responden, dengan nyeri sebelum *Prenatal Massage* menurut FPS-R sedikit lebih nyeri dan setelah dilakukan *Prenatal Massage* dengan nyeri menurut FPS-R sedikit nyeri.

Berdasarkan data di atas dan menurut uji statistik *Spearman Rank* dengan bantuan program SPSS 17 pada taraf $\alpha = 0,05$ dilakukan perhitungan untuk mengetahui apakah pengaruh antara variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Hasil dari perhitungan $p\ value$ adalah $0,000 < \alpha (0,05)$ yang artinya ada pengaruh *Prenatal Massage* terhadap nyeri punggung pada ibu hamil.

Menurut peneliti *Prenatal massage* dapat mengurangi rasa tidak nyaman dan sakit pada daerah punggung selama kehamilan, dikarenakan *prenatal massage* dapat mengurangi kelelahan dan membuat tubuh lebih berenergi dengan cara mengeluarkan produk metabolisme dalam tubuh limfatisik dan sistem sirkulasi. Ketidak nyamanan ibu hamil seperti kram, ketegangan otot, dan kekakuan otot dapat berkurang setelah dilakukan pijat karena sirkulasi yang lancar memudahkan kerja jantung dan tekanan darah sehingga ibu hamil merasa lebih segar. Selain hal tersebut hormon endorphin yang dihasilkan saat pemijatan akan mempermudah ibu menjadi relax.

Prenatal Massage adalah pijat yang dilakukan pada ibu hamil untuk memperlancar sirkulasi darah ibu dan mengurangi keluhan yang sering dialami ibu hamil. Jenis pijatan disesuaikan dengan persyarahan tubuh ibu hamil. *Prenatal Masagge* pada ibu hamil dapat membantu untuk mengeluarkan produk-produk metabolisme tubuh melalui limfatisik dan sistem sirkulasi yang dapat mengurangi kelelahan dan membuat ibu lebih berenergi, sistem sirkulasi yang lancar dapat memudahkan beban kerja jantung

dan membantu tekanan darah ibu hamil menjadi normal, ketidak nyamanan otot, seperti kram, ketegangan otot, kekakuan otot yang sering dirasakan oleh ibu hamil, dapat dikurangi dengan pijat. *Prenatal massage* juga dapat membantu mengurangi depresi dan kecemasan pada ibu hamil yang disebabkan perubahan hormonal selama kehamilan, menenangkan dan merelaksasikan ibu hamil yang sering mengalami kecemasan, sehingga ibu hamil dapat merasakan tidur yang lebih berkualitas. Hal tersebut dipengaruhi oleh hormon *endorphin* yang dihasilkan saat pemijatan dengan hormon *endorphin* ibu akan lebih cepat merasa rilex (Ihca, 2014, 2).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian tentang Pengaruh *Prenatal Massage* Terhadap Penurunan Nyeri Punggung Pada Ibu Hamil Trimester III maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penurunan nyeri punggung pada ibu hamil trimester III sebelum dilakukan *prenatal massage* di Desa Ceweng, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang hampir dari setengah ibu hamil trimester III mengalami nyeri punggung dengan FPS-R sedikit lebih nyeri.
2. Penurunan nyeri punggung pada ibu trimester III sesudah dilakukan *prenatal massage* di Desa Ceweng, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang hampir dari setengah ibu hamil trimester III mengalami nyeri punggung dengan FPS-R dengan sedikit nyeri.
3. Terdapat pengaruh *prenatal massage* terhadap penurunan nyeri punggung ibu hamil trimester III di Desa Ceweng, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang.

Saran**1. Bagi Responden**

Diharapkan bagi ibu hamil untuk mempertahankan dan meningkatkan wawasan tentang *prenatal massage* agar ibu hamil tidak takut untuk melakukan pijat saat hamil dan nyeri punggung pada ibu hamil berkurang.

2. Bagi Bidan

Diharapkan bidan untuk melaksanakan pelatihan *prenatal massage* supaya bidan dapat memberikan *prenatal massage* pada kelas ibu hamil dan memberikan sosialisasi kepada ibu hamil sejak dini.

3. Bagi Dosen STIKES ICME.

Diharapkan hasil penelitian ini menjadi acuan untuk pengabdian masyarakat untuk dosen khususnya tentang *prenatal massage*.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik, diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian tentang *prenatal massage*. Yaitu menganalisis manfaat lain *prenatal massage* dalam kelancaran proses bersalin.

KEPUSTAKAAN

Harsono, T. 2013. *Permasalahan Kehamilan Yang Sering Terjadi*. Jakarta: Platinum

19
Ihca (Indonesia Holistic care Association),
2014, *Touch Training: Developing Mom, Baby Massage And Spa*. Semarang.

Kovacs, Francisco M dkk. *Prevalence and Factors Associated With Low Back Pain and Pelvic During Pregnancy*. Health Services

Research: SPINE Volume 37.
2012.

Nursalam, 2015. *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan Pendekatan Praktis*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Medika

Ratih, 2016. *Pengaruh Endorphin Massage Terhadap Penurunan Intensitas Nyeri Punggung Ibu Hamil*. <http://stikesmuhla.ac.id/wp-content/uploads/26-34-Ratih-Irdah-K.pdf> diakses pada 17 Maret 2019

Robson, S. Elizabeth dan Waugh, Jason. 2013. *Patologi Pada Kehamilan*. Jakarta : EGC

Vamey, H. 2014. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Edisi IV*. Jakarta. EGC

Walyani, E.S. 2015. *Asuhan Kebidanan pada Kehamilan*. Yogyakarta : Pustaka Banjarmas

PENGARUH PRENATAL MASSAGE TERHADAP PENURUNAN NYERI PUNGGUNG PADA IBU HAMIL TRIMESTER III

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

- | | | |
|---|---|-----|
| 1 | repo.stikesicme-jbg.ac.id
Internet Source | 2% |
| 2 | Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur
Student Paper | 1% |
| 3 | Rini Rahmayanti, Yola Yolanda.
"EFFECTIVENESS OF BACK EFFLUERAGE MASSAGE THERAPY USING CLOVE OIL ON UNDER BACK PAIN IN POSTPARTUM MOTHER", Nurse and Health: Jurnal Keperawatan, 2019
Publication | 1% |
| 4 | Isnayati Isnayati, Suhatridjas Suhatridjas.
"Kompres NaCl 0,9% dalam Upaya Menurunkan Nyeri Post Insersi AV Fistula pada Pasien Gagal Ginjal Kronik", Journal of Telenursing (JOTING), 2020
Publication | <1% |
| 5 | digilib.uinsby.ac.id
Internet Source | <1% |

- | | | |
|----|---|------|
| 6 | journal.ipm2kpe.or.id
Internet Source | <1 % |
| 7 | repository.unjaya.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 8 | Syaiful Bachri. "Pengaturan Waktu Pemberian Makanan Tambahan dengan Status Gizi Berdasarkan Tinggi Badan Balita", Jurnal Kesehatan dr. Soebandi, 2020
Publication | <1 % |
| 9 | jurnal.unimus.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 10 | docplayer.info
Internet Source | <1 % |
| 11 | repository.helvetia.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 12 | Budi Hartanto, Moh Alimansur. "Keterkaitan Status Gizi Dengan Kejadian Phlebitis Pada Pasien Dewasa Di Ruang Flamboyan RSUD Gambiran Kota Kediri", Jurnal Ilmu Kesehatan, 2017
Publication | <1 % |
| 13 | journal.pancabudi.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 14 | Alex Setiawan, Neti Juniarti, Fanny Adistie. "DESCRIPTION OF PARENTING STYLES ON ADOLESCENTS WITH RISK BEHAVIOR IN | <1 % |

VOCATIONAL HIGH SCHOOL "X"
PANGANDARAN REGENCY", Jurnal Kesehatan
Komunitas, 2020

Publication

-
- 15 Franata Suriana Esthi, Eko Mindarsih, Murni Murni. "Faktor-Faktor Mutu Pelayanan Kebidanan yang Mempengaruhi Tingkat Kepuasan Pasien di Poli Kebidanan RSUD Wonosari", Jurnal Kesehatan Ibu dan Anak, 2017 <1 %
- Publication
-
- 16 Eniyati, Dechoni Rahmawati, Lily Yulaikhah. "PATH ANALYSIS FAKTOR YANG MEMENGARUHI KETEPATAN PEMAKAIAN KONTRASEPSI SUNTIK DMPA BERDASARKAN REASONED ACTION THEORY (RAT)", MEDIA ILMU KESEHATAN, 2020 <1 %
- Publication
-
- 17 Lukmanulhakim Lukmanulhakim, Desti Agustina. "Yoga Pernapasan (Pranayama) Terhadap Kecemasan Keluarga Pasien Kritis Di Ruang ICU", Jurnal Aisyah : Jurnal Ilmu Kesehatan, 2018 <1 %
- Publication
-
- 18 Ni Luh Gede Intan Saraswati, Ni Luh Yoni Sri Antari, Ni Luh Gede Suwartini. "Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kepatuhan Pembatasan Cairan Pada Pasien Chronic <1 %

Kidney Disease Yang Menjalani Hemodialisa",
Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Husada: Health
Sciences Journal, 2019

Publication

19

repository.poltekkes-manado.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On